

**NOTICE****ORICEDAL***Phénazone / Chlorhydrate de lidocaïne***COMPOSITION**

Phénazone.....4 g  
 Chlorhydrate de lidocaïne anhydre.....1 g  
 Excipients q.s.p.....100 g

**PROPRIÉTÉS**

Anesthésique local, antiseptique, anti-inflammatoire.

**INDICATIONS**

Traitement symptomatique local à visée antalgique, en particulier, des :

- Otites grippales.
- Otites barotraumatiques.
- Otites moyennes aiguës dans leur phase congestive.

**CONTRE-INDICATIONS**

- Destruction tympanique d'origine infectieuse ou traumatique.
- Hypersensibilité à l'un des constituants, notamment à la Lidocaïne.

**MISES EN GARDE**

- Par mesure de précaution, s'assurer de l'intégrité tympanique avant toute prescription.
- En cas de destruction tympanique, l'administration intra-auriculaire risque de mettre en contact le produit avec les structures de l'oreille moyenne et d'être à l'origine d'effets indésirables à leur niveau.

**EFFETS INDESIRABLES**

Possibilité de réactions locales (irritation ou sensibilisation).

**MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE**

Pratiquer 2 ou 3 instillations par jour. Verser 4 gouttes dans le conduit auditif externe, à l'aide du bouchon compte-gouttes.

Durée du traitement : 10 jours au maximum.

**FORME ET PRESENTATION**

Solution auriculaire (gouttes).

Flacon en verre brun de 15 ml avec bouchon compte-gouttes.

**CONDITIONS DE CONSERVATION**

Conserver à une température inférieure à 25°C.

**Vente libre**

N° A.M.M. : E-2009-0072

**LABORATOIRES OLEA**

**25 BP 276 ABIDJAN 25**